

TRAVAUX SCIENTIFIQUES DE L'ARMÉE D'ORIENT (1916-1918).

COLÉOPTÈRES BRUCHIDÆ (LARIIDÆ),

PAR M. M. PIC.

Parmi les Coléoptères, la famille des *Bruchidæ* est une des plus difficiles à étudier pour les raisons suivantes : 1° les anciens auteurs n'ont pas toujours, même en employant de longues descriptions, bien défini les formes décrites par eux, aussi les auteurs postérieurs les ont-ils fréquemment interprétées de façons différentes; 2° par les graines, des espèces exotiques sont fréquemment importées, çà et là, en Europe, ne cadrant pas avec les formes des monographies publiées; 3° certaines espèces sont fort variables dans la coloration de leurs membres et se miment plus ou moins; 4° on a souvent affaire à des exemplaires plus ou moins défraîchis, ou mal préparés pour l'étude. On ne s'étonnera donc pas que j'aie mis, pour ces diverses raisons, et par mesure de prudence, quelques points de doute et même mentionné sans nom les n°s 17 et 18 peu caractérisés.

1. *Spermophagus sericeus* Geofr. (*cardui* Boh.). — Albanie : environs de Koritza, en juillet (D^r Blanc, E. Jupille et V. Odezene). Macédoine : Lumnica (600 m.) en juillet (D^r E. Gromier); Zemplac, Sud du lac Prespau, en septembre (Raoul Brisson); sud de Monastir. Holeven, en août (Infirm. Brunico); Florina, en juillet (H. Marcelet); camp Grosseti (800 m.) à 5 kilomètres Ouest de Florina, en mai (C^{ne} Magdelaine).

2. *Spermophagus Kusteri* Schils. (*variolosopunctatus* Kust). — Albanie : environs de Koritza, en août (D^r Blanc); Macédoine : Florina, en juillet (H. Marcelet); montagnes à l'Ouest du Vardar (600 m.) en août (D^r Gromier); Sud de Monastir entre Brikovo et Holeven, en juin (Infirm. Bunico); Ostrova, en août et Vodena, en juillet (D^r Rivet); Sakulevo, en juillet (D^r J. Goulden); camp Grosseti (800 m.) à 5 kilomètres Ouest de Florina, en mai (C^{ne} Magdelaine). Chalcidique : Vassilica en juin, juillet (D^r Rivet).

3. *Spermophagus subfasciatus* Boh. — Macédoine : camp de Zeiteulik, près de Salonique (D^r Rivet). Un seul exemplaire. Espèce d'origine exotique et importée. Déjà connue, en Europe, comme importée à Paris.

4. *Bruchus laticollis* Boh. — Macédoine : Ostrovo, Ouest de Vodena, en août (D^r Rivet).

5. *Bruchus tristiculus* Fahr. — Macédoine : Salonique (D^r Rivet).

6. *Bruchus rufimanus* Boh. — Macédoine : Ostrovo, Ouest de Vodena,

en septembre, et Salonique (D^r Rivet). Chalcidique : Wassilica, en juillet (D^r Rivet).

7. *Bruchus pisorum* L. — Macédoine : Genidje Vardar, en août (D^r Joyeux); Salonique, en avril (D^r Rivet).

8. *Bruchus brachialis* Fahr. — Albanie : environs de Koritza, en août (D^r Blanc). Macédoine : Florina, en juillet (H. Marcelet); Salonique (D^r Rivet). Chalcidique : Vassilica, en juin, juillet (D^r Rivet).

9. *Bruchus sertatus* Ill. — Albanie : environs de Koritza (D^r Blanc). Macédoine : Kadikoy, mission du Vardar (R. Michel, 1910).

10. *Bruchus ulicis* Muls. — Macédoine : Kadikoy, mission du Vardar, en avril (R. Michel, 1910).

11. *Bruchus? vicie* Ol. — Macédoine : Florina, en juillet (H. Marcelet). Un exemplaire défloré et, pour cette raison, pas sûrement déterminé.

12. *Bruchidius spiniger* Baudi. — Mytilène, en avril (D^r Landrieu). Localité intéressante, l'espèce étant connue de la Turquie d'Asie, de Lesbos et de Sardaigne (capture sans doute accidentelle).

13. *Bruchidius bimaculatus* Ol. — Macédoine : Florina, en juillet (H. Marcelet).

14. *Bruchidius bimaculatus* Ol. — Macédoine : Florina, en juillet (H. Marcelet).

15. *Bruchidius tibialis* Boh. — Macédoine : Florina, en juillet (H. Marcelet).

16. *Bruchidius? anxius* Fahr. — Macédoine : Florina, en juillet (H. Marcelet).

Un seul exemplaire, pas très frais.

17. *Bruchidius* sp. (? *varius* Ol. var.). — Macédoine : Vakoufkeui, N. E. Florina (H. Marcelet).

Petite espèce, de forme oblongue, noire, à revêtement gris sale presque uniforme, avec la base des antennes et les pattes, au moins les antérieures, en parties testacées, postérieures parfois presque toutes noires; prothorax court et large, presque droit sur les côtés, courtement rétréci en avant; élytres courts et plus larges que le prothorax, à épaules marquées; cuisses postérieures inermes.

18. *Bruchidius* sp. (? *obscuripes* Gylh. var.). — Macédoine : Sakulevo, en juillet (D^r J. Goulden).

Un seul exemplaire entièrement noir, à prothorax long et régulièrement conique, semblant différer de *obscuripes* Schon. par la pubescence grise uniforme, les antennes toutes noires, celles-ci ont les articles 2 et suivants allongés et les derniers élargis, non dentés.